

IMPACTO DEL SSFT SOBRE UN GRUPO DE 7 PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA CONSIGUE IMPLANTACIÓN EN UNA FARMACIA COMUNITARIA DE ALBACETE

Carbajal de Lara JA ¹, Polo Gómez M ², Jareño Collado, P³

¹Farmacéutico Comunitario de Albacete. Vocal AF COF Albacete, ²FoCo COF Albacete, ³CIM COF Albacete

E mail de contacto: jcarbajald@hotmail.com

Con la colaboración de:  **cinfa**
Nos mueve la vida

Impulsado por:  **CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS**



conSIGUE
Implantación



Objetivo

Evaluar el impacto de realizar el SSFT a siete pacientes durante 1 año.

Comparar los estados de situación (ES) preintervención y postintervención (12 meses).

Métodos

Tipo de estudio: Estudio observacional descriptivo en el marco del programa de investigación conSIGUE implantación y se desarrolló según sus directrices y protocolos

Tiempo de estudio: 12 meses

Lugar: Farmacia comunitaria sita en Albacete capital.

Criterios de inclusión: Ser mayor de 65 años y tomar 5 o mas medicamentos.

Numero de pacientes incluidos: Siete.

Visitas: Tras una visita inicial, fueron citados a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses.



Cada visita tenía como resultado un estado de situación, en el que se analizaban los PRM y RNM.

Resultados

Visitas: 53 visitas programadas y 17 no programadas, con una media de 10 visitas totales por paciente.

Mediciones: 22 mediciones (media de 3,1) a los pacientes: medida de la PA, peso, altura y medición del IMC.

RNM: Fueron detectados un total de 38 RNM (media de 5,4 por paciente), de los cuáles tres cuartas partes fueron de seguridad (29; 76%).



Discusión/Conclusiones

Las intervenciones farmacéuticas fueron mayoritariamente aceptadas (92,1%) lo que propició la resolución del 71,1% de los RNM.

Esto demuestra la buena interrelación profesional que existe entre el farmacéutico y el médico, con impacto positivo para el paciente tanto en resultados en salud como en percepción de la calidad de vida, que aumentó poco más del 10%.

La aplicación del SSFT a estos 7 pacientes ha permitido reducir los problemas de salud y de medicamentos prácticamente en un 8%, consiguiendo un mayor control de los pacientes que se tradujo en la ausencia de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios durante el periodo.

Bibliografía

MARTINDALE: "The Complete Drug Reference" 38th edición. Pharmaceutical Press (2014)

STOCKLEY, IVAN H: "Interacciones farmacológicas" 3ª edición. Pharma Editores (2009)

Panel electrónico patrocinado por:

