

UTILIZACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y PERFIL DE PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS EN INGRESADOS EN UN PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN CON OPIACEOS

3123



Maria Dolores Muñoz², Mónica Ferrit¹, Sara García Agudo¹, M^a Encarnación Morales², Adolfin Ruiz², Miguel Ángel Calleja¹

¹Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

²Facultad de Farmacia, Universidad de Granada

m.dolores.mr@hotmail.com



Introducción: El tratamiento de mantenimiento con metadona es el tratamiento farmacológico más ampliamente disponible para la adicción a opiáceos y se ha demostrado en un periodo de 40 años para ser un tratamiento eficaz y seguro. Actualmente, se acepta que en los pacientes que siguen un tratamiento de mantenimiento con metadona disminuyen el consumo de opiáceos ilegales, el riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las conductas ilegales relacionadas con el consumo y el riesgo de mortalidad, y también mejora la calidad de vida. Por tanto, deberán continuar teniendo un lugar destacado en el abordaje de la dependencia de opiáceos.

Objetivos: Analizar el consumo de drogas de abuso y perfil de prescripción de fármacos pacientes en tratamiento en desintoxicación con opiáceos ingresados en un hospital de tercer nivel.

Materiales y Métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado en el año 2014 con un cohorte trasversal de 5 meses (Enero 2014-Mayo 2015).

Criterio de inclusión:

- > 18 años
- Incluidos en programa de deshabituación
- Con metadona oral
- Tratamiento con fármacos analgésicos


Variables de estudio:

- Edad
- Sexo
- Nº y servicio de ingreso
- Indicación opiáceos
- AINEs y coadyuvantes
- Drogas de abuso


Los datos fueron recogidos de las historia clínica de los pacientes y registros de dispensación hospitalaria (Prima Athos®). El consumo de tóxicos se confirmó tras el resultado positivo del test StatusFirst TM®.

Resultados y discusión: Se incluyeron un total de 21 pacientes con una edad media de 21.64 años, el 71.43% hombres y 28.57% mujeres.


Principales servicios




Fármacos para tratamiento del dolor



Fármacos coadyuvantes



Drogas de abuso



Conclusiones: Tras los resultados obtenidos se puede concluir que el la mayoría de los pacientes son hombres incluidos en un programa de deshabituación en tratamiento con metadona oral, la mayoría de ellos ingresan a través del servicio de urgencias. Las benzodiazepinas y el paracetamol son los principales fármacos prescritos bajo control médico para el tratamiento de la ansiedad y el dolor, sin embargo aún consumen cocaína y cannabis que posiblemente sean causa de su ingreso hospitalario, por lo que es necesario establecer medidas de educación sanitaria para incentivar el programa de deshabituación a opiáceos.