

## DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN PACIENTES CON DOLOR Y VALORACIÓN DE SU ESTADO DE SALUD EN LA FARMACIA COMUNITARIA ONUBENSE

Alonso C<sup>1</sup>, Beas AI<sup>2,3</sup>, Bravo E<sup>2,3</sup>, Coronado MJ<sup>1</sup>, Barba R<sup>2,3</sup>, del Castillo MI<sup>2,3</sup>  
calarrocha@hotmail.com

(1) Centro de Información del Medicamento COFH  
(2) Grupo de Atención Farmacéutica COFH  
(3) Farmacéutico Comunitario



### Objetivos:

Estudiar el perfil del paciente que retira en la farmacia un medicamento estupefaciente valorando su estado de salud.  
Estudiar el posible incremento en el consumo de este tipo de fármacos.

### Metodología:

Estudio descriptivo transversal multicéntrico realizado en 25 farmacias comunitarias de la provincia de Huelva. Se incluyen pacientes que acuden a retirar un estupefaciente, cumplimentándose una hoja de registro diseñada para el estudio. Se valora el estado de salud del paciente en el momento de la dispensación empleándose una escala visual del 0-100. Mediante los datos de facturación, se compara la diferencia en el consumo de estupefacientes en los meses de junio de 2012 y 2015..

### HOJA DE REGISTRO

HOJA DE REGISTRO		El mejor estado de salud
Fecha:	Nº OF: Nº Paciente:	
Datos del paciente		
Edad: Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer		
Datos del tratamiento		
CN dispensado:		
Nombre del medicamento:		
Quién lo prescribe por primera vez: <input type="checkbox"/> Atención Primaria <input type="checkbox"/> Especialista <input type="checkbox"/> Urgencias <input type="checkbox"/> No sabe		
Fecha inicio tratamiento: Posología prescrita: Posología usada:		
Sabe para qué es: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Sí Sabe cómo usarla: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		
Tipo de dolor: <input type="checkbox"/> Dolor crónico no oncológico. Especificar: <input type="checkbox"/> Dolor oncológico <input type="checkbox"/> Dolor peri operatorio / postoperatorio <input type="checkbox"/> Dolor agudo en atención urgente <input type="checkbox"/> Dolor agudo asociado a procedimientos menores (no invasivos o mínimamente invasivos)		
Ha tomado antes otros analgésicos para este problema: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí		
Actuación Farmacéutica: <input type="checkbox"/> Dispensar con educación sanitaria <input type="checkbox"/> Derivar a Seguimiento Farmacoterapéutico <input type="checkbox"/> Derivar al médico <input type="checkbox"/> Asesorar sin dispensar		


Escala visual analógica de la salud del paciente HOY:  
1) Nos gustaría conocer la buena o mala que es la salud del paciente HOY.  
2) El paciente marcará con X en la escala indicando su estado de salud HOY.  
3) Escríbalo en el recuadro el número marcado por el paciente en la escala.

SU SALUD HOY =


### Resultados:

Participan 116 pacientes (28,31% hombres y 71,68% mujeres) con una edad media de 65,04 años.  
La instauración del tratamiento es llevada a cabo en Atención Especializada en un 60,87% de los casos, en Atención Primaria en un 33,91% y un 4,35% de los tratamientos proceden de urgencias.


### PERFIL DEL PACIENTE QUE RETIRA EL ESTUPEFACIENTE SEGÚN EDAD y SEXO




### TIPO DE ESTUPEFACIENTE DISPENSADO



### TIPO DE DOLOR TRATADO




### TIPO DE DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO TRATADO



El consumo de estupefacientes en junio de 2015 se ha incrementado un 18,70% con respecto a junio de 2012.

### PERCEPCIÓN DE SALUD



### Conclusiones:

La percepción sobre el estado de salud de los pacientes con dolor es mejor en el hombre y en el rango de edad de 45 a 65 años.  
En la farmacia comunitaria se observa un incremento progresivo en el consumo de estupefacientes. El papel del farmacéutico debe ser fundamental para garantizar un uso racional de los mismos.