

ESTUDIO SOBRE LA FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Fernández-López L., Navarro-Zaragoza J., Falcón Romero M., Pérez Cárceles M.D., Osuna de Alborno E.
Área de Medicina Legal y Forense, Dpto. Ciencias Sociosanitarias, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia. E-mail de contacto:
lucia.fernandez2@um.es

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:


La elevada administración de fármacos en las sociedades desarrolladas ocasiona problemas de seguridad principalmente por interacciones farmacológicas, intoxicaciones o errores en su dosificación y suponen en muchos casos un elevado gasto económico. El objetivo del estudio es estimar la prevalencia de consumo de fármacos en la Región de Murcia, así como estudiar su relación con variables sociodemográficas como la edad, el sexo o el nivel de estudios.

MATERIALES Y MÉTODOS:


El estudio consistió en la elaboración de un cuestionario sobre consumo de fármacos, completado por 482 pacientes seleccionados aleatoriamente en una Oficina de Farmacia y 8 Centros de Salud de la Región de Murcia. Los resultados fueron analizados mediante el paquete de datos estadístico SPSS 19.0

RESULTADOS:

Frecuencia de consumo diario de fármacos



Tiempo consumo diario de fármacos




↑↑ -Consumo
-Duración tto

Población más susceptible

Variable	% de consumo de fármacos diario	Variable	% de consumo de fármacos diario
Sexo	Hombre: 43,9% Mujer: 56,1%	Edad	≤ 40: 10,9% 41-65: 48,9% ≥ 66: 40,2%
Nivel de estudios	Sin estudios: 7,5% Básicos: 41,1% Secundarios: 19,3% Superiores: 32,1%	Profesión	Ama de casa: 19,3% Jubilado: 36,6% Administrativo: 4,7% Personal sanitario: 8,7% Profesor: 5% Otro: 25,7%

Fármacos más consumidos



CONCLUSIONES:

Existe un elevado porcentaje de población mayor de 18 años en tratamiento crónico en la Región de Murcia, casi un 75%, cifra más elevada respecto a lo esperado. Dicho consumo se encuentra relacionado con la edad, el nivel de estudios y la profesión de la población, análisis que resulta estadísticamente significativo.

Estudios anteriores han alertado de la relación entre el empoderamiento del paciente y los tratamientos farmacológicos. Por este motivo, se deberían desarrollar más estudios para determinar si realmente dichos tratamientos son necesarios o más concretamente, si todos los fármacos prescritos son necesarios para una adecuada salud del paciente y finalmente evaluar su seguridad.

Panel electrónico patrocinado por:

