



## ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA A LOS PACIENTES CON ANTINEOPLÁSICOS ORALES

García Agudo, Sara<sup>1\*</sup>; Ferrit Martín, Mónica<sup>2</sup>; Marchena León, Antonio<sup>3</sup>; Muñoz Castillo, Isabel María<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Servicio de Farmacia. Hospital Carlos Haya. Málaga

<sup>2</sup> Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

<sup>3</sup> Oficina de Farmacia Comunitaria. Málaga

[\\*saragarciaagudo@gmail.com](mailto:saragarciaagudo@gmail.com)



### OBJETIVOS

Elaborar un protocolo normalizado de trabajo para la atención farmacéutica a los pacientes con antineoplásicos orales

### MÉTODO

Revisión bibliográfica sistemática de la literatura



Para identificar las fuentes de información se realizó la búsqueda por consulta directa e internet en las bases de datos de Scielo, osh y MEDLINE vía Pubmed



encontrando los mejores resultados en MEDLINE, por lo que se estableció un criterio de búsqueda utilizando los términos del MeSH. Se consideró adecuado el uso de los descriptores «Antineoplastic Agents», «Administration, Oral», «Cytostatic Agents». Se aplicaron los límites «Humans», y se utilizaron los conectores booleanos «OR» y «AND». Estrategia de búsqueda en MEDLINE

((«Antineoplastic Agents»[Mesh]) OR «Administration, Oral» [Mesh]).

(«Cytostatic Agents»[Mesh]) AND  
Año de publicación: desde 2010 hasta 2015

También se hizo una búsqueda en sumarios de revistas, actas, sumarios de reuniones científicas, libros, ... para buscar publicaciones, protocolos y guías existentes hasta abril 2015. El protocolo fue también revisado por otros farmacéuticos y oncólogos prescriptores del hospital.

### RESULTADOS

Para la elaboración de este protocolo se ha realizado un análisis de 72 documentos sobre el manejo seguro de antineoplásicos orales. 46 de ellos son artículos descritos en Pubmed y el resto documentos encontrados en revistas, libros, sumarios de reuniones científicas, ...

Las recomendaciones para los pacientes estuvieron relacionadas con

- la manipulación domiciliaria de estos fármacos
- la administración segura de los mismos
- y la gestión de excretas de pacientes en tratamiento.

Se establecieron unas instrucciones generales de manejo de quimioterapia oral para pacientes, padres y cuidadores ( en la quimioterapia oral para niños).

### DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

Los pacientes oncológicos que reciben tratamiento ambulatorio con antineoplásicos orales deben ser considerados grupo prioritario para su participación en programas de conciliación de medicamentos. Una manera de mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos de alto riesgo es disponer de protocolos detallados y explícitos.

Panel electrónico patrocinado por:

