



ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON DUPLICIDADES EN EL USO DE BENZODIAZEPINAS

M^a Dolores Llamas del Castillo (*) ; Luis Baró Rodríguez (*) ; Rafael Páez Valle (*) ; Raquel Abaurre Labrador (); Antonio Pintor Mármol (**)**

(*) Farmacéutico de Atención Primaria

(**) Farmacéutico comunitario

Contacto: dolores.llamas.sspa@juntadeandalucia.es

OBJETIVOS: Identificar los pacientes con duplicidad en la prescripción benzodiazepinas en un Distrito Sanitario.

Establecer un procedimiento de revisión y seguimiento farmacoterapéutico para disminuir los efectos adversos ligados a su prescripción simultánea.



Duplicidad
2 BZ de acción corta o
2 BZ de acción larga
+ 2 meses
1.886 pacientes
Marzo 15

Informe farmacéutico



Revisión médica
-37,42% de pacientes
Junio 15

MÉTODO:

Fuente: Micrc

Población Di:

Material apoyo : Listado pacientes, Boletín Farmacoterapéutico
Consultas personalizadas

Tiempo: 3 meses

RESULTADOS:

Reducción global marzo-junio de duplicidades **9.7 %**

Reducción de las duplicidades notificadas **37,42%**

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES:

Disminución importante en las duplicidades de benzodiazepinas notificadas.

Eficacia en la colaboración médico farmacéutico con el procedimiento descrito.

Aparecen nuevos casos por tanto, la estrategia de reducción de duplicidades de benzodiazepinas debe de ser un procedimiento proactivo y continuo dentro de la actividad de atención farmacéutica.

